

voor het absorberen van exsudaat om de peristomale huid bij een urostoma te beschermen

Case study submitted by Laetitia Quenault, Stoma Care Nurse, Hôpital Tenon- Paris

Achtergrond

- 77-jarige dame.
- 2017 - Urotheelcarcinoom. Pelvectomie en Bricker-operatie met een urostoma tot gevolg.
- Juli 2018 - Operatie borstkanker linker- en rechterborst.
- 2021 - Parastomale hernia gediagnosticeerd.

Ondervonden problemen

- 2022 - Erytheem huidreactie met bezorgdheden om vlekken. Patiënt had een grote parastomale hernia, maar werd geweigerd voor een revisieoperatie.
- Wil geen abdominale compressieband dragen.
- Communicatieproblemen. Parastomale maceratie zichtbaar op foto's, maar patiënt voelt zich ongemakkelijk bij een persoonlijk consult en geeft de voorkeur aan alleen een telefoongesprek.

Verpleegkundig advies

April 2022 - Huidirritatie was duidelijk. Na het testen van meerdere producten stemde de dame in met een persoonlijk consult om een oplossing te vinden.

Gezien de aard van de zaak moest snel een doeltreffende routine worden gevonden.

“Ik moest snel en efficiënt handelen zodat de patiënt vertrouwen had en we vooruitgang boekten in haar zorg.”

Advies gegeven om trial eakin **Cohesive**[®] groot te proberen en daarna een eakin **freeseal**[®] om te helpen met de peristomale huidbeschadiging. De afdichtingen werden gekozen omdat is gebleken dat zij doeltreffend zijn voor de absorptie die nodig is voor het maceratie-niveau dat in dit geval optreedt.


Voor



Oplossing met eakin freeseal[®]

Huid: De toestand van de peristomale huid is duidelijk verbeterd.

Stomabeheer: De dame blijft eakin **freeseal**[®] gebruiken, ze ervaart minder maceratie en heeft geen pijn meer.



Mei 2022



Augustus 2022



Oktober 2022



November 2022



Huid blijft verbeteren met
het gebruik van eakin
freeseal[®].